RISICOMINIMALISATIEMATERIAAL BETREFFENDE XYREM®, NATRIUMOXYBAAT, VOOR PATIËNTEN

Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen en zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

VOOR DE PATIËNT

INSTRUCTIES VOOR HET VERDUNNEN VAN XYREM®, NATRIUMOXYBAAT

Let op: de bereidingswijze van de in te nemen dosissen natriumoxybaat verschilt per fabrikant. Controleer of u de juiste instructie voor bereiding van uw medicijn gebruikt. Het is belangrijk dat u alleen de spuit gebruikt die in de doos wordt geleverd bij het bereiden van dosissen natriumoxybaat.

Instructies voor het verdunnen van natriumoxybaat:

De volgende instructies leggen uit hoe natriumoxybaat moet worden bereid, Lees de instructies a.u.b. aandachtig door en volg deze stap voor stap. De doos bevat een fles natriumoxybaat -oplossing voor oraal gebruik, een indruk-flesadapter, een doseerspuit, twee doseerbekertjes met kindveilige doppen om uw twee nachtdosissen in te bereiden en bewaren, en de bijsluiter voor natriumoxybaat (zie afbeelding 1)

Afbeelding 1



Lees de bijsluiter door voordat u de eerste twee dosissen natriumoxybaat inneemt, zodat u ook op de hoogte ben van andere belangrijke informatie. Gebruik natriumoxybaat altijd precies zoals uw arts heeft gezegd.

Als u nog andere vragen of zorgen hebt over natriumoxybaat, neem dan gerust contact op met uw arts.

U moet beide dosissen voor uw bedtijd bereiden.

Neem natriumoxybaat 2 of 3 uur na het avondeten, en niet eerder. Laat elke dag evenveel tijd tussen het avondeten en de eerste inname van natriumoxybaat.

1. Verwijder de dop van de fles door deze tegelijkertijd in te drukken en linksom te draaien (tegen de klok in). Na het verwijderen van de dop zet u de fles rechtop op een tafelblad. Boven op de fles zit een met plastic bedekt afdeklaagje, dat u moet verwijderen voordat u de fles voor het eerst gebruikt (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2



Houd de fles rechtop en steek de indruk-flesadapter in de hals van de fles. Dit hoeft u alleen te doen als u de fles voor het eerst opent. Daarna kan de adapter voor verder gebruik in de fles blijven zitten (zie afbeelding 2).

2. Plaats vervolgens de punt van de doseerspuit in de opening midden in de flessenhals en druk deze stevig omlaag (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3



3. Houd de fles en spuit vast met één hand en zuig met de andere hand de voorgeschreven dosis op door aan de plunjer te trekken. **OPMERKING**: Het middel kan de spuit alleen inlopen als u de fles rechtop houdt (zie afbeelding 4).



Afbeelding 4

4. Verwijder de spuit uit de opening midden in de flessenhals. Spuit het middel in een van de meegeleverde doseerbekertjes door op de plunjer te drukken. Herhaal deze stap voor het tweede (zie afbeelding 5).



Afbeelding 5

5. Plaats de meegeleverde doppen op de doseerbekertjes en draai elke dop rechtsom (met de klok mee) totdat deze vastklikt in de kindveilige stand (zie afbeelding 6). Spoel de spuit uit met water.



Afbeelding 6

6. Vlak voordat u gaat slapen, zet u de tweede dosis in de buurt van uw bed. Mogelijk moet u een wekker zetten zodat u wakker wordt voor het innemen van uw tweede dosis. Deze moet u minimaal 2,5 uur en maximaal 4 uur na de eerste dosis innemen. Verwijder de dop van het eerste doseerbekertje (zie afbeelding 7) door op het kindveilige vergrendelingslipje te drukken en tegelijkertijd de dop linksom te draaien (tegen de klok in). Drink zittend in bed de volledige eerste dosis op, doe de dop weer op het bekertje en ga meteen liggen.



Afbeelding 7

7. Wanneer u 2,5 tot 4 uur later wakker wordt, verwijdert u de dop van het tweede doseerbekertje. Drink zittend in bed de tweede dosis helemaal op voordat u gaat liggen om verder te slapen. Doe de dop op het tweede bekertje.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn. Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product: UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2, 4822 NH Breda, telefoonnummers 0800 3434335 (gratis) en 0765 731130 en e-mail: UCBCares.nl@ucb.com.

Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op www.UCBCares.nl.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

U kunt extra materiaal aanvragen bij UCB Pharma B.V. (telefoon 0800 3434335 (gratis) en 0765 731130; UCBCares.nl@ucb.com).